

図 2.

2-1~2-4, ムネアカツヤアナバチ *Alysson pertheesi* (2-1, 2-3, 2-4メス ; 2-2オス) ; 2-5, 2-6, ニッポンツヤアナバチ *Alysson cameroni* (2-5メス ; 2-6オス) ; 2-7~2-9, ニッコウツヤアナバチ *Alysson monticola* (2-7メス ; 2-8, 2-9オス) ; 2-10, 2-11, ハクサンツヤアナバチ *Alysson japonicus* (2-10メス ; 2-11オス) ; 2-12, ヤマトドロバチモドキ *Nippononysson rufopictus*, オス.

オオドロバチモドキ *Nysson spinosus* (Forster, 1771) [図1-5, 3-3, 3-4]

体長9~12mm. 黒色. 前胸背に黄帯をもち, 腹部第1節から3節には1対ずつの黄紋あるいは黄帯がある. 後翅でん室は肘脈基部の少し手前で終わる. メスの頭盾前縁は中央に2つの窪みがあり, オスでは前縁が幅広く突出し, 先端は直切状となる.

分布: 北海道, 本州, 九州: ヲスリー.

日本産の個体群は亜種 *N. s. malaisei* Gussakovskij, 1933 とされる.






図3. ツヤアナバチモドキ属 *Didineis* およびドロバチモドキ属 *Nysson*.

3-1, 3-2, ナンブツヤアナバチモドキ *Didineis sibirica* (3-1メス ; 3-2オス) ; 3-3, 3-4, オオドロバチモドキ *Nysson spinosus* (3-3メス ; 3-4オス) ; 3-5, ヒメドロバチモドキ *Nysson trimaculatus*, メス.

ヒメドロバチモドキ *Nysson trimaculatus* (Ross, 1790) [図1-6, 3-3]

体長6~8mmで前種より小形。黒色。前胸背には数個の黄紋、あるいは1個の黄帯をもつが、完全に消失する個体もある。腹部第1節から3節には1対ずつの黄紋がある。後翅でん室は肘部基部より少し後方に達する。頭部前縁は中央に1対の歯をそなえる。

分布：北海道、本州、四国、九州、対馬；ヨーロッパ、日本産の個体群は亜種 *N. t. japonicum* Tsuneki, 1964 とされる。

アカオビドロバチモドキ *Nysson maculosa* (Guelin, 1790)

体長6~8mm。頭部、胸部は黒色で、前胸背、盾板に黄紋をもつ。メスの腹部第1節は赤褐色で、腹部第1節から3節には1対ずつの黄紋がある。脚関節は黒色で、脛節は赤褐色味を帯びる。オスの触角第12節は著しく肥大し、第13節（末節）は強く彎曲する。

分布：北海道（利尻島）；朝鮮半島、中国、ユーラシア。久松・長瀬（2004）に本種の写真が掲載されている。






図4. アワフキバチ亜科 Gorytinae (1). アワフキバチ属 *Gorytes*.

4-1, 4-2, ミスジアワフキバチ *Gorytes tricinctus* (4-1メス ; 4-2オス) ; 4-3, 4-4, コウライアワフキバチ *Gorytes koreanus* (4-3メス ; 4-4オス) ; 4-5, ハクトウアワフキバチ *Gorytes neglectus*, メス ; 4-6, アイヌアワフキバチ *Gorytes aino*, メス ; 4-7, ナミアワフキバチ *Gorytes maculicornis*, オス.






図5. トゲアワフキバチ属 *Argogorytes*, フタモンアワフキバチ属 *Lestiphorus*, コイケアワフキバチ属 *Eogorytes*, カワラアワフキバチ属 *Harpactus*.

5-1, 5-2, オオトゲアワフキバチ *Argogorytes mystaceus* (5-1メス; 5-2オス); 5-3, ニッポントゲアワフキバチ *Argogorytes nipponis*, メス; 5-4, 5-5, フタモンアワフキバチ *Lestiphorus bilumulatus*, メス; 5-6, コイケアワフキバチ *Eogorytes fulvohirtus*, メス; 5-7, カワラアワフキバチ *Harpactus tumidus* (メス; 標本写真提供, 田塾 正・室田忠男氏).





7-1



7-2



7-3



7-4



7-5



7-6



7-7

図7.

7-1, ニッポンハナダカバチ *Bembix niponica*, メス ; 7-2, タイワンハナダカバチ *Bembix formosana*, メス ; 7-3, 7-4, キアシハナダカバチモドキ *Stizus pulcherrimus*, オス ; 7-5, ヤマトスナハキバチ *Bembecinus hungaricus*, メス ; 7-6, リュウキュウスナハキバチ *Bembecinus bimaculatus*, メス ; 7-7, オガサワラスナハキバチ *Bembecinus anthracinus*, メス.